

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Bonn.
Direktor: Prof. Dr. Martini.

Untersuchungen
über die Thrombocytenzahlen bei Menschen
aus höheren Altersgruppen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des Doktorgrades

der

H o h e n M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn

vorgelegt am 10. Juni 1939

von

Gertrud Ottowess

Ärztin

aus Bonn.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Dozent Dr. Heymer.

Korreferent: Prof. Dr. Martini.



Meinen lieben Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Seit Bizzozero im Jahre 1883 seine grundlegende Arbeit über die Blutplättchen als dritten Formbestandteil des Blutes veröffentlichte, hat das Interesse für die Blutplättchenfrage in starkem Maße zugenommen. Bisher sind jedoch die grundsätzlichen Fragen nach der Abstammung und den Funktionen der Thrombocyten ungelöst. Die Zusammenhänge zwischen Thrombocytenzahl und Blutungsübeln sind zahlreich. Es ist allgemein bekannt, daß die Blutplättchen bei Gerinnungsprozessen beteiligt sind und daß ihre Verminderung in ätiologischer Beziehung steht mit gewissen haemorrhagischen Diathesen. Neuerdings wird den Thrombocyten eine Rolle bei der Heilung der Infektionskrankheiten zugeschrieben. Man nimmt an, daß sie bei der Antikörperbildung beteiligt sind.

Es bestand vielfach die Ansicht, daß diese physiologisch so wichtigen Blutbestandteile im Alter erheblich vermindert seien. Nach Demmer, der zu seinen Untersuchungen zum Teil erkrankte und bettlägerige alte Leute heranzog, ist die Durchschnittsblutplättchenzahl im Senium 85 000. Auf ihn beziehen sich O. Naegeli in seinem Lehrbuche und Hittmair in seinen Plättchenreferaten.

Arneith fand bei seinen Untersuchungen über das qualitative und quantitative Thrombocytenbild im Greisenalter bei zehn gefunden alten Leuten normale Thrombocytenzahlen mit einem Durchschnittswert von 224 000. Der von ihm gefundene Höchstwert war 320 000, der niedrigste 144 000.

Demmer fand als Höchstwert 85 000 und als niedrigsten Wert 23 800. Er nimmt an, daß die von ihm gefundene Herabsetzung der Blutplättchenzahl im Senium durch eine Altersatrophie der Knochenmarksriesenzellen begründet ist. Nach der Wright'schen Theorie, die heute die meisten Anhänger hat, sind die Thrombocyten Abschnürungsprodukte von dem Protoplasma der Megakariocyten. Die letzteren — Knochenmarksriesenzellen — entstehen aus den Myeloblasten und sind eigenartig strukturierte 20—40 μ große Zellen mit charakteristischen Kernen. Man sieht im strömenden Blut meistens nur kleine Kernteile, weil die größeren in den Kapillaren abgefangen werden. Durch pseudopodienartige Abschnürung des Protoplasmas als Funktion der Megakariocyten kommen die Plättchen in die Knochenmarksvenen. Die quantitativen Befunde Arneith's lassen nun nicht auf eine beginnende oder fortschreitende Knochenmarksatrophie im Senium schließen.

Auf Anregung aus der medizinischen Klinik habe ich Blutplättchenzählungen bei 30 alten Leuten im Alter von 60—92 Jahren vorgenommen. Es handelte sich um 15 Männer und 15 Frauen, die alle gesund und nicht bettlägerig waren. Es wurde darauf geachtet, daß sie auch von den üblichen chronischen Alterserkrankungen frei waren.

Die Thrombocytenzählungen wurden nach der Fonio'schen Methode durchgeführt, die auch Demmer in seinen Blutplättchenuntersuchungen im Senium angewandt hat. Diese Methode hat den Vorteil der guten Darstellbarkeit der Plättchen, zumal die Kleinheit, Labilität und Agglutinabilität der Plättchen die Zählungen sehr erschwert. Nur in

einem Punkte wurde von der Fonio'schen Methode abgewichen. Das richtige Mischungsverhältnis des Magnesiumsulfats mit dem Blut läßt sich sicherer herstellen, wenn man erst die Stichwunde anlegt, dann das Magnesiumsulfat aufträgt und durch leichtes Auseinanderziehen der Wundränder die Größe des Bluttropfens reguliert. Außerdem braucht man für die Herstellung mehrerer Ausstriche nicht immer wieder neu einzustechen. Ebenso wie es Demmer angibt, haben wir die Untersuchungen in den Vormittagsstunden zwischen 8–10 vorgenommen. Dies stimmt zwar nicht ganz mit Fonio überein, hat aber, wie sich aus den Kontrolluntersuchungen an jungen Leuten ergibt, keinerlei Wechsel der Werte zur Folge. Diese Abweichung war notwendig, weil alle nüchtern untersucht wurden und weil die alten Leute aus den Altersheimen in den Morgenstunden am besten abkömmlich waren.

Zunächst wurden zur Kontrolle Blutplättchenzählungen an 10 jungen Leuten vorgenommen. Hierbei ergab sich, wie aus der Tabelle I ersichtlich, ein Mittelwert von 235 600. Er entspricht genau den von Fonio aufgestellten Sätzen.

Nach Fonio beträgt die Durchschnittszahl der Blutplättchen beim erwachsenen Menschen 234 000. Sie schwankt zwischen 130 000 und 300 000. Drüber und drunter liegende Werte sind als pathologisch anzusehen, während Zahlen unter 200 000 leicht vermindert sind.

In allen Fällen wurde ein ganzer Blutstatus gemacht. Wenn man die Tabelle betrachtet, so sieht man, daß die Werte alle im Bereiche der Norm bleiben. Die Resistenz der roten Blutkörperchen war immer normal. Die Minimumsresistenz schwankte

zwischen 0,52 und 0,34. (Nach der Methode von Ribierre). Die Blutgerinnungszeit (nach der Hohlperlenkapillarmethode) war in einigen Fällen etwas verzögert, die vollendete Gerinnung schwankte zwischen 8 und 15 Minuten. Die Blutungszeit betrug durchschnittlich 1—2 Minuten, in einem Fall 3 Minuten 10 Sekunden. Das weiße Blutbild ergab in drei Fällen eine Eosinophilie und in mehreren Fällen eine leichte Lymphocytose. Die Leukocytenwerte schwankten zwischen 4800 und 8800. Die niedrigste ausgezählte Erythrocytenzahl war 3,6 und die höchste 5,2 Millionen im Kubikmillimeter. Da die Erythrocytenzahl mit der unter 1000 Erythrocyten ausgezählten Plättchenzahl multipliziert wird, kann durch Schwankungen der Erythrocyten ein verändertes Thrombocytenbild entstehen. Aus diesem Grunde wurde immer hinter der absoluten auch die unter 1000 Erythrocyten ausgezählte Plättchenzahl angegeben. Hierbei war der höchste Wert 72 und der niedrigste 31. Die hohen sowohl wie die niedrigen Grenzwerte wurden in allen Fällen zweimal festgestellt mit mehreren Tagen Zwischenzeit. Diese Untersuchungen ergaben übereinstimmende Resultate. Die roten Blutkörperchen wurden immer zweimal gezählt aus zwei verschiedenen Mischpipetten, um möglichst genaue Werte zu erhalten.

Der nach der oben angegebenen Methode gewonnene und an der Luft getrocknete (24 Stunden stehen lassen) Thrombocytenausstrich wurde mit Giemsalösung gefärbt. Zunächst werden die Ausstriche 3 Minuten in Methylalkohol fixiert. Man nimmt eine doppelstarke Giemsalösung und färbt eine Stunde lang. Die Plättchen ließen sich bei

starken Vergrößerung immer gut erkennen und lagen gleichmäßig verteilt und isoliert.

Es folgt nun die Tabelle II mit den untersuchten alten Leuten, dem Alter nach geordnet.

Wie aus der Tabelle II ersichtlich, ergab sich bei den untersuchten alten Leuten im Alter von 60–92 Jahren im Durchschnitt eine Blutplättchenzahl von 237 100 im Kubikmillimeter, praktisch derselbe Wert wie bei Arneht. Der niedrigste Wert war 148 800 und der Höchstwert 338 400. Eine Thrombopenie wurde in keinem Falle angetroffen. Diese Werte sind die gleichen wie die von Fonio aufgestellten Mittelwerte. Verglichen mit Fonio's Befunden am jungen Mann sind die Schwankungen nach oben und unten auch dieselben. Nach oben zu ist ein Spielraum von 101 300 und nach unten von 88 300.

Mithin kann man sagen, daß die Blutplättchenzahl keinen Veränderungen durch Alterserscheinungen unterliegt und daß auch im Senium eine gute Thrombocytopoese anzunehmen ist.

Bei den Frauen liegen die Blutplättchenzahlen im Mittel etwas höher als bei den Männern. Es ergab sich bei den Frauen eine Durchschnittszahl von 251 000 Thrombocyten und bei den Männern von 221 000. Demmer fand diesen Unterschied auch in seinen Untersuchungen.

Zusammenfassung.

An 30 alten Leuten im Alter von 60—92 Jahren wurden Thrombocytenzählungen vorgenommen. Es fand sich ein Mittelwert, der der von Fonio aufgestellten Normalzahl entspricht und die Arneethen Befunde durchaus bestätigt. Der Durchschnittswert ist 237 100. Die Werte schwanken zwischen 148 000 und 338 000. Es besteht somit keine Verminderung der Blutplättchenzahl im Senium.

Es wäre sicher von großem Interesse, durch weitere Untersuchungen, die über den Rahmen dieses Themas hinausgehen, zu prüfen, ob nicht durch Erkrankungen, insbesondere Infektionen, die Thrombocytenregeneration im höheren Alter mehr gestört wird als bei jungen Menschen.

Herrn Dozent Dr. Heymer danke ich für die Anregung zu dieser Arbeit und Beratung bei der Ausführung derselben und Herrn Professor Dr. Martini für die Übernahme des Korreferates.

Tabelle I.

Name	Geschlecht	Alter	Thrombocyten	Erythrocyten	Resistenzbestimmungswert	Gerinnungszeit	Blutungszeit	HaemoglobinLeitz	Färbe-Index	Leukocyten	Senkungsgeschwindigkeit Westerg.	Differenzialblutbild						
												Ba	EO	Jgl	St	Seg	Ly	Mo
1. Coe	+O+O ₁ +O ₂ +O ₃ +O ₄ +O ₅	24	248400 (46)	5,4	0,50—0,38	8—10	1' 10"	82%	0,8	6200	3/8	—	2	—	5	54	35	4
2. Ens		25	187200 (39)	4,8	0,50—0,40	8—10	1' 30"	97%	1,1	5600	3/9	—	4	—	2	46	46	2
3. Krä		25	290000 (58)	5,0	0,48—0,38	9—10	1'	100%	1,0	10800	4/16	—	3	—	1	58	38	-
4. Har		27	200000 (40)	5,0	0,48—0,36	8—9	1'	100%	0,9	8000	5/13	—	—	—	1	58	38	3
5. Düx		28	228800 (43)	5,2	0,46—0,38	10—13	3' 15"	98%	0,9	5600	2/5	—	1	—	1	62	33	4
6. Schl		26	260100 (51)	5,1	0,46—0,38	8—10	2' 30"	92%	0,9	6800	1/3	—	2	—	2	63	29	4
7. Hart		24	220500 (45)	4,9	0,50—0,40	7—9	1' 15"	91%	0,9	5400	8/17	—	2	2	4	61	28	3
8. Schm		28	280500 (55)	5,1	0,48—0,38	9—10	2'	95%	0,9	5800	2/4	—	—	—	3	63	32	2
9. Schn		26	229000 (55)	4,2	0,48—0,36	7—9	1'	88%	1,0	7200	5/12	—	—	2	2	63	29	4
10. Ott		27	212000 (53)	4,0	0,50—0,38	7—10	1' 10"	90%	1,1	6800	4/9	1	7	—	1	47	41	3

Tabelle II.

1. Hin	+O+O ₁ +O ₂ +O ₃ +O ₄ +O ₅	60	225600 (48)	4,7	0,50—0,38	10—14'	2' 30"	82%	0,9	6800	6/13	1	3	—	3	66	28	1
2. Lad		60	293700 (62,5)	4,7	0,52—0,40	11—14'	1' 25"	95%	1,0	5000	4/17	—	3	—	1	56	39	1
3. Flö		61	305500 (65)	4,7	0,44—0,34	11—13'	1' 10"	100%	1,0	8200	7/18	—	—	—	2	66	31	1
4. Gul		62	235000 (50)	4,7	0,50—0,40	9—11'	1' 20"	106%	1,1	5400	5/22	—	2	—	1	54	41	2
5. Kal		63	200000 (40)	5,0	0,50—0,38	9—11'	1' 15"	97%	0,9	6800	4/13	—	—	—	4	57	34	5
6. Pas		65	239200 (46)	5,2	0,50—0,38	9—11'	1' 25"	96%	0,9	8200	15/28	—	1	—	2	58	35	4
7. Bek		66	155800 (38)	4,1	0,46—0,38	13—15'	2' 10"	103%	1,2	4800	9/22	—	4	—	5	33	42	1
8. Meh		66	180000 (40)	4,5	0,52—0,42	10—13'	1' 30"	92%	1,0	7600	9/24	—	5	—	4	58	32	1
9. Rad		70	254400 (53)	4,8	0,52—0,46	6—8'	1'	93%	0,9	5400	5/17	—	3	—	2	67	26	2
10. Str		71	258000 (64,5)	4,0	0,52—0,40	10—14'	1' 10"	94%	1,1	8400	29/59	—	6	—	2	71	19	1
11. Kam		72	148800 (31)	4,8	0,50—0,38	14—17'	3' 10"	93%	0,9	7200	19/32	—	2	—	3	70	23	2
12. Bra		73	237600 (54)	4,4	0,50—0,36	6—9'	1' 10"	86%	0,9	7200	24/49	—	4	—	2	63	26	5
13. Wol		73	295200 (61,5)	4,8	0,50—0,40	8—10'	1' 15"	92%	0,9	6200	6/17	1	1	—	4	63	28	3
14. Schi		74	229500 (45)	5,1	0,50—0,38	13—15'	2' 10"	104%	1,0	8800	10/27	1	3	—	2	65	29	1
15. Jun		74	234000 (52)	4,5	0,50—0,38	11—14'	2' 10"	93%	1,0	5000	7/19	2	5	—	2	57	30	1
16. Ems		75	230300 (49)	4,7	0,50—0,40	8—10'	1' 40"	96%	1,0	7000	18/33	—	1	—	2	62	35	-
17. Här		76	229500 (51)	4,5	0,44—0,38	12—14'	1' 15"	95%	1,0	7000	5/12	—	2	—	3	66	25	4
18. Ber		78	188700 (37)	5,1	0,50—0,36	11—14'	1' 15"	100%	0,9	6600	23/48	—	—	—	4	68	26	2
19. Koh		79	226800 (42)	5,4	0,50—0,38	9—12'	1' 40"	86%	0,8	5200	3/8	—	2	—	3	77	17	1
20. Feh		80	220500 (49)	4,5	0,52—0,44	9—10'	1' 20"	88%	0,9	7000	9/19	—	2	—	5	72	21	-
21. Kan		80	262200 (46)	5,7	0,48—0,38	11—14'	1' 20"	100%	0,8	6600	4/9	—	—	—	2	74	21	3
22. Bru		81	338400 (72)	4,7	0,50—0,42	9—12'	1' 20"	99%	0,9	6000	23/41	—	—	—	2	64	22	2
23. Kra		81	245000 (50)	4,9	0,48—0,38	8—10'	2' 20"	93%	0,9	4800	12/20	—	2	—	3	70	25	-
24. Bal		82	301600 (58)	5,2	0,52—0,40	8—10'	1' 10"	98%	0,9	5200	3/9	—	—	—	4	62	27	2
25. Kra		86	162500 (32,5)	5,0	0,52—0,42	11—14'	1'	92%	0,9	6600	16/38	—	2	—	2	59	34	3
26. Wir		86	230300 (49)	4,7	0,50—0,38	10—13'	1' 20"	92%	0,9	4600	4/9	—	1	—	5	55	37	2
27. Kna		89	226800 (42)	5,4	0,48—0,38	9—11'	1' 15"	87%	0,8	6800	17/36	—	—	—	1	60	37	2
28. Zep		91	214500 (55)	3,9	0,50—0,40	8—10'	1'	80%	1,0	4800	6/24	—	1	—	4	67	24	2
29. Koh		92	299200 (68)	4,4	0,50—0,36	9—10'	1' 30"	91%	1,0	8000	9/23	—	2	1	6	61	27	3
30. Gre		92	244400 (52)	4,7	0,48—0,36	9—11'	1' 50"	98%	1,0	7400	7/18	—	1	—	3	64	29	3

Schrifttumsverzeichnis.

1. **Demmer**, Fol. haematolog. (Leipzig) 27 (1922).
 2. **Arneth**, Archiv für klin. Medizin 1939.
 3. **Naegeli, O.**, Lehrbuch der Blutkrankheiten 1931.
 4. **Schilling**, Das Blutbild und seine klinische Verwertung (Jena) 1933.
 5. **Hittmair**, Fol. haematolog. (Leipzig) 59 (1938).
 6. **Hittmair**, Fol. haematolog. (Leipzig) 35 (1928).
 7. **Arneth**, Spezielle Blutkrankheiten. Bd. IV (Münster) 1936.
 8. **Degkwitz**, Studien über Blutplättchen, Fol. hamatolog. 24 (1920).
 9. **Frey, H. C.**, Thrombose und Immunität, Dtsch. Archiv für klin. Medizin 1 (1928).
-

Lebenslauf.

Am 9. Februar 1911 wurde ich, Gertrud Ottowess, als Tochter des Schneidermeisters Bernhard Ottowess und seiner Ehefrau Maria geb. Jungbluth, in Bonn am Rhein geboren. Von 1918 an besuchte ich das Liebfrauen-Oberlyzeum in Bonn und bestand dort 1930 das Abitur. Anschließend studierte ich Chemie, Zoologie und Botanik und vom Wintersemester 1932 an Medizin an der Universität Bonn. Dortselbst bestand ich das ärztliche Vorexamen im August 1934 und das ärztliche Staatsexamen im Sommersemester 1937. Während des praktischen Jahres war ich auf der Geburtshilf.-Gynäkolog. Abteilung des Elisabethkrankenhauses und anschließend in der medizinischen Universitätsklinik in Bonn tätig.
